Tandheelkundige chirurgie

Over het algemeen zijn antibiotica geen behandeling voor tandheelkundige problemen bij honden en katten.

- Er is geen indicatie om dagen voorafgaand aan een chirurgische ingreep in de mondholte antibiotica te geven (zie chirurgische antibioticaprofylaxe).
- Tijdens een parodontale chirurgie moeten diepe zakken worden gereinigd (mogelijk chirurgische resectie) en bij het verwijderen van tanden die door parodontale problemen zijn aangetast, moet ontstoken weefsel worden verwijderd en worden gesloten met een flap.
- Een tand met een abces en een periapicale radiolucentie wordt normaal gesproken niet behandeld met antibiotica, alleen als er systemische symptomen en/of een verminderde algemene toestand zijn (patiënten met ASA 3 of hoger).

Na de operatie

Er is geen indicatie om antibiotica na de operatie te gebruiken. Chloorhexidine mondspoeling (voor huisdieren) kan zowel voor als na de operatie ***eenmaal daags gedurende 7-14 dagen*** worden gebruikt.

SAP en antibioticabehandeling

	STOF, DOSERING EN TOEDIENINGSWEG	DOSERING
Chirurgische antibioticaprofylaxe	Ampicillin, 20 mg/kg, IV	Vóór de operatie binnen 60 minuten na de incisie en herhaald elke 2 uur tot het einde van de operatie.
Antibioticabehandeling	Amoxicillin, 10 mg/kg, PO Clindamycin, 5.5 mg/kg, PO Als je geverifieerde osteomyelitis hebt - niet alleen radiolucentie, 11 mg/kg, PO	q 8–12 h voor 7 dagen q 12 h voor 7 dagen q 12–24 h voor 4 weken

*Uittreksels uit de antibiotica richtlijnen voor behandeling en profylaxe van AniCura.

De AniCura Antibiotica Richtlijnen zijn samengesteld door ervaren dierenarts-specialisten, gestaafd aan wetenschappelijk onderzoek. AniCura aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

HANDLE ANTIMICROBIALS WITH CARE

Wij maken deel uit van
World Antimicrobial Awareness Week
om antimicrobiële resistentie te voorkomen.

AniCura