



# Tandheelkundige chirurgie

Over het algemeen zijn antibiotica geen behandeling voor tandheelkundige problemen bij honden en katten.

- Er is geen indicatie om dagen voorafgaand aan een chirurgische ingreep in de mondholte antibiotica te geven (zie chirurgische antibioticaprofylaxe).
- Tijdens een parodontale chirurgie moeten diepe holtes worden gereinigd (mogelijk door chirurgische resectie) en bij het verwijderen van tanden die door parodontale problemen zijn aangetast, moet ontstoken weefsel worden verwijderd en worden gesloten met een flap.
- Een tand met een abces en een periapicale radiolucentie wordt normaal gesproken niet behandeld met antibiotica, alleen als er systemische symptomen en/of een verminderde algemene toestand zijn (patiënten met ASA 3 of hoger).



## Na de operatie

Er is geen indicatie om antibiotica na de operatie te gebruiken. Chloorhexidine mondspoeling (voor huisdieren) kan zowel voor als na de operatie **eenmaal daags gedurende 7-14 dagen** worden gebruikt.

## SAP en antibioticabehandeling

	STOF, DOSERING EN TOEDIENING	DOSERING
<b>Chirurgische antibioticaprofylaxe</b> →	Ampicilline 20 mg/kg, IV	Vóór de operatie (maximaal 60 minuten voorafgaand aan incisie) en herhaald elke 2 uur tot het einde van de operatie.
<b>Antibioticabehandeling</b> →	Amoxicilline 10 mg/kg, PO Clindamycine 5,5 mg/kg, PO  Als je geverifieerde osteomyelitis hebt (niet alleen radiolucentie): clindamycine 11 mg/kg, PO	q 8-12h voor 7 dagen q 12 h voor 7 dagen q 12-24 h voor 4 weken

De AniCura Antibiotica Richtlijnen zijn samengesteld door ervaren dierenarts-specialisten, gestaafd aan wetenschappelijk onderzoek. AniCura aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. \*Uittreksels uit de antibiotica richtlijnen voor behandeling en profylaxe van AniCura.



Wij maken deel uit van **World Antimicrobial Awareness Week** om antimicrobiële resistentie te voorkomen.

